

Zidoval[®] gel

metronidazol 0,75%

Pasientveiledning - ved behandling av bakteriell vaginose

Undersøkelsen har vist at dine plager sannsynligvis skyldes en kraftig økning av antall bakterier i skjeden. Sagt på en annen måte - en forskyvning av den normale bakteriesammensetningen skjer ved at antallet melkesyredannende bakterier avtar og antallet andre bakterier øker. På legespråket kalles tilstanden bakteriell vaginose (BV). Tilstanden er ufarlig, men plagsom når den forårsaker en ganske uttalt og dels illeluktende utflod.

Årsaken til at kvinner får disse plagene er fortsatt temmelig uklar. Det kan skyldes en kombinasjon av forskjellige faktorer, bl.a. skjedeslimets surhetsgrad (pH), samleiehyppighet osv.

Tilstanden er ingen kjønnsykdom og partnerbehandling har derfor ingen betydning.






Du har fått resept på et medikament som vil fjerne plagene i løpet av få dager. Det er av stor viktighet at du bruker all medisinen. Samleie bør unngås i behandlingstiden.

Skulle du få symptomene tilbake kan det bli nødvendig med ny behandling.

Bruksanvisning

Les pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. 1 dose vaginalkrem (5g) føres inn i vagina 1 gang pr dag ved sengetid i 5 dager. (Se bilder)

Denne pasientveiledningen er utarbeidet av Dr Tom Seeberg, praktiserende spesialist i fødsels- hjelp og kvinnesykdommer.



MEDA

Askerveien 61 • PB 194 • N-1371 Asker
tlf: 66 75 33 00 • www.meda.no